

ما هو الختان؟

الختان هو الإزالة الجراحية لقطعة الجلد التي تغطي رأس القضيب (ولتي يطق نحيها القيلة). وغالبًا ما ملتصق بالولادة وبولادة طبي يتولى الأم.

ولأسباب مختلفة، قد يوصى بعدم إجراء عملية الختان للطفل بعد الولادة بمثلر قسبب مثلثة حاد في الرعي الصحية أو لسبب تشريحي يطلب التقييم من قبل جراح هلال كبولية نخصر في الأظفال. وكما هو الحال مع أي إجراء جراحي فإن هناك مخاطر وفوائد متبظبه.

دور القيلة

يتمثل دور القيلة على القضيب في عملية رأس القضيب (الخشفة) من البول والهراس ومبيبات الابهاب الأخرى فهيت حمي ضد حدوث العدوى والتندب في فتحة البول وحمي ضحت من السالخفة.

بوالنسبة للأشخاص من البيونالي موي فإن الختان طوس بيني. وبين 1920 و1950 شاع الختان لأسباب غير بيبي في الدول المتحشبالغة الإلحليزية.

إلا أن الختان ليس شرط عفي للبي وأمريكا اللوسطى وأمريكا اللجنوية وأغلب أنحاء أوروبا. وتي دنسبة للذكور غير لامختين في العالم عن 80%.

فوائد الختان

- الحد من مخاطر اللت عدوى المبرالك البولوية. إن مخاطر لصيلة الواليل للذكور عدوى مجرى البول خلال العام الأول من حيك همتكون قلهية. إلا أن حالات العدوى المتكثرون أكثر شيوع عفي للذكور غير لامختين. وللمخاطر تكور قلهية ضيفي للذكور غير لامختين.
- تبفع أوتعالج المبرالك الكالي التي تصرب بالقضيب: **شبه قضيق القيلة** (وهي حال تقو في القيلة تبت عطي رأس القضيب بسبب إكمام زطاد اليمكن سجه) (جنبها اليفلبي يتكثرف عن رأس القضيب). والشبم بقضيق القيلة (غير شرط ويمكن محولة علاج مبولسطة الةدوية للمرض علة **هاب الخشفة**، التهاب قدي حدث في رأس القضيب. وهو غير شرط محذرك. إذا حدث مدهال الحقبشرك لتمكرو، قدي تم اقتلي رفي الختان.
- يقلل من خطر الإصرب بسرطان القضيب لدى للذكور الأكبر سنًا. ولارغم من أن هذا السرطان نادر جدًا فمؤل شيوع الة للذكور لامختين. و هو حدث أكثر لدى للذكور اللين لا يتبعون نظامًا محيدًا للضاط نحي للظفة.

إجراء الختان

عندما يجري أخرطي للمبرالك البولوية الختان فإن ذلك يتم بعد رعية للمرضى الأخر عفي نفي لمبتفسي الوبي أو مشاة **مجم عيبي Liberty** (تتفبالغة الإلحليزي ققط). وتتسم بالراحة لمدة 45-60 دقيقة ويتم ملتخدام التخير للعام أو إلحصار النخاعي. وسيتحدث معك أخرطي التي تخير بش أن التخير /السريطرة على اللم الذي يتم اصياره للطفل. ويتخدم أخرطي للمبرالك البولوية هنا لللوب "الراحة اليدوية" و هو ضيف عن للاليب للشبك أو ملتخدام الحلقه الهالديليكي (Plastibell).

يتم إغلاق الشق الجراحي (لمنطقة التي يتقطعها) إبل غزرال نخي طال جراحي القيلة للذوبان أو غزرال نخي طال جراحي القيل للذوبان الصرق للجد للمرضي.

لسيطرة على الأم

يمكن لطفل كلال العودة إلى المدرسة أو دار الرعاية النهارية عند إيشع بالراحة وعدم احتياج إلى مركز طبي وصفة طبية. وعادةً ما يكون هذا خلال يومين إلى خمسة أيام.

نصائح طبيبة حول كيفية حل هذه الأعراض

- عدم القدرة على التبول بعد مرور ست إلى ثماني ساعات على الجراحة
- حمى درجة 101 درجة فهرنهايت أو أعلى
- إفرازات خضراء أو صفراء من خط الغرز مع زيادة الاحمرار والتورم الألم
- القيء أو الإسهال من ثلاث مرات، وعدم القدرة على الاحتفاظ بالسوائل
- ألم الشفوي بدل غليظة، التي ينبغي أوقفها باستخدام الأدوية المبركة للألم
- نيف اليمكن السريطرة على إيباض غط لم يتم. إذا احتظت نزال دم ببطء ف هذا طبيعي. إذا كان ذلك لم يتق اطر م يتم، لخص غطبتبات لمدة 15 دقيقة بدون النظر وبدون نقائل الضغط. إذا لم يتم النزف، نحص لها المفتح أو طبيبة المراك الصولية لفي اوب على الفور.

Last Updated 09/2024

Reviewed By Amanda Luciano, RNII, Newborn Intensive Care Unit